

Cómo puede ayudarle la ginecología regenerativa

La ginecología regenerativa engloba diferentes aspectos para tratar las alteraciones de la región vulvo-vaginal, como:

- Atrofia
- Incontinencia urinaria de esfuerzo
- Suelo pélvico
- Verrugas
- Hiperlaxitud
- Despigmentación
- Labioplastia de reducción...




Hay varias técnicas y herramientas a disposición del especialista, como; *tratamientos hormonales, tópicos, lubricantes, cirugía, infiltraciones de ácido hialurónico, toxina botulínica, radiofrecuencia, láser...* y será el ginecólogo/a el que determine en cada caso cual es el más indicado.

Sin embargo, el láser de CO₂ está aportando grandes ventajas en eficacia, seguridad y tiempos de recuperación mínimos para muchos de los trastornos.

Debido a la falta de producción de estrógenos por la disminución del funcionamiento ovárico, se producen un conjunto de síntomas en los tejidos de los genitales externos que serían: Síntomas vulvo-vaginales como; **sequedad, escozor, tirantez o prurito**, Síntomas de tracto urinario inferior como; **disuria**, síndrome de frecuencia-urgencia e **incontinencia urinaria** de urgencia y síntomas de la esfera sexual como **dispareunia** y alguna **disfunción sexual** derivada y todos ellos juntos conforman el **Síndrome genitourinario de la menopausia**.

El rejuvenecimiento vaginal con láser de CO₂ fraccionado produce un calentamiento selectivo de las capas superficiales aumentando la microvascularización, mejorando el metabolismo local, estimulando la síntesis proteica y neocolagenogénesis.

El resultado




El resultado es un engrosamiento de la mucosa, mejorando la hiperlaxitud, la atrofia vaginal, la incontinencia de esfuerzo y reestableciendo el pH.

El tratamiento, antes durante y después

Antes de someterse a un tratamiento solo se necesita una revisión ginecológica básica.

El procedimiento es muy sencillo, tolerable y no requiere preparación.

El tratamiento consiste en introducir un espéculo dentro de la vagina, después se introduce la sonda del láser para emitir la energía.



La sesión suele llevar unos 20 minutos. La incorporación a la vida normal se produce en el 99% de los casos en las primeras 24 horas tras el procedimiento y no suelen producirse efectos adversos. Se suelen dar por precaución unas pequeñas recomendaciones para los 5 o 6 días posteriores.

Número de sesiones aconsejadas

El tratamiento suele requerir de 2 a 4 sesiones, con un intervalo de 5 a 7 semanas.

Para mantener los resultados a largo plazo se recomienda repetir una sesión al año.

Para ampliar esta información pida una cita informativa con nuestra especialista en ginecología regenerativa y suelo pélvico, la orientará de cuál es el tratamiento más indicado en su caso.

Clínica MultiLaser

C/ Santa Isabel, 45 – 28012 Madrid

☎ 91 528 42 20 - 📞 +34 682 48 00 85 - ✉ info@clinicamultilaser.com

www.clinicamultilaser.com - www.reparatupiel.com